

Nový výzkum ukazuje, že **chroničtí uživatelé paracetamolu mají slabě zvýšené riziko hematologických malignit**

. Riziko je nízké a stále není jasné, jakou roli hraje léčivo. Dřívější práce ukázala, že aspirin může snížit případy úmrtí na rakovinu colonu, ale zvyšuje riziko krvácivých vředů. Dr. Emily White a kolektiv z Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu provedli první velkou prospektivní studii u 65000 starších mužů a žen ve státě Washington, všichni byli bez historie rakoviny (kromě kožní) ve výchozím stavu. V úvodu byli dotazováni na užívání analgetik v posledních deseti letech.

Za průměrných asi 6 let se u 577 (méně jak 1%) rozvinula hematologická malignita. Více jak 9% z nich užívalo vysoké množství paracetamolu ve srovnání s pouze 5%, kteří neonemocněli. Po přepočtu na věk, artritidu a rodinnou historii krevních malignit měli chroničtí uživatelé paracetamolu téměř dvojnásobné riziko rozvoje choroby. Studie předpokládá, že u starších 50 let by užívání paracetamolu alespoň 4x týdně alespoň 4 roky mohlo zvýšit riziko na 2%. Žádná jiná analgetika včetně aspirinu a ibuprofenu nebyla spojena s rizikem krevní rakoviny.

Zdroj: J Clin Oncol 2011; <http://bit.ly/18aYlO>